

珍ラシクハ無イガ、敢テココニ報ズル所以ノモノハ、一株ノ葉ノ全部ガ二岐シテキルト云フバカリデナク、分岐ノ程度モ葉軸ノ下部乃至葉柄ノ基部近クニ迄及ンデキル事デアル。或ハ年々同様ナ状態ヲ繰返ヘスノデハナイカト考ヘタノデ、株ハソノママ殘シテ置イタ。(檜山庫三)

○こたぬきらん

こたぬきらん (*Carex Doenitzii* BOECKLER) ハ吾國諸高山ニヨク見受ケルすげデアルガ、其雌花穂ハ多少トモ柄ヲ有シ、ソノ長サハ先ヅ1-4 糎位ガ普通ノ様デアル。トコロガ、數多イ中ニハ稀ニ 30 糎ニモ達スル驚クベキ長柄ヲ有スルモノガアル事ヲ知ツタノデ、此處ニ其寫眞ヲオ目ニカケル。(檜山庫三)




A teratogeny of *Polystichum varium* PRESL

いちしだノ畸形

○猫トさるなし

俗ニモ「猫トまたたび」ト謂ハレル位ニ、猫ハまたたびヲ好ムガ、コレト近縁ノさるなし (*Actinidia arguta* PLAUCHON) ニモまたたびニ近イ作用ノアル事ニ氣付イテキル人ハ少ナイ様ダ。但さるなしノ場合ハ根ニ限ラシイ。(檜山庫三)



A form of *Carex Doenitzii* BOECK

こたぬきらんノ一型

(羽前朝日岳産)

○圖ノ入レ違ヒ

圖ノ入レ間違ツタノハ時々見ル所デアルガコゝニ念入リニモ4 枚ノ圖版ガリレー式ニ宿換ヘシテ居ルノガアル。モウトウノ昔御存ジカモ知レマセンガ氣ガツイタノデ次ニ述ベル。ソレハ HOOKER ノ A Second Century of Ferns (1861) デ、第 78 圖ハ 80 ノ *Asplenium emarginatum*, 第 80 圖ハ 82 ノ *Asplenium Seelosii*, 第 82 圖ハ 86 ノ *Selaginella Vogelii*, 第 86 圖ハ 78 ノ *Gymnopteris minor*, コレデー回廻ツタ事ニナル。

(伊藤 洋)

○やくしまねつたいらんノ分布追報

本誌第十一卷十二號デ本種ノ分布ヲ述ベタ後土井美夫氏ヨリノ通信ニ接シテサラニ二產地ヲ得タノデ追報シテ置ク。即チソノーツハ薩摩國野間岳デ九州本土デハ甌島ノ對岸ニ位シ、同氏ノ採集ニカハリ、ソノニツハ北九州ノ海上、壹岐國デアツコレハ田代善太郎氏ノ談話ニ依ル由デアル。後者ハ對馬暖流ノ影響ヲ如實ニ示スモノト云ヘ様。(前川文夫)

○うゑまつさうノ北限地

うゑまつさう (*Sciaphila tosaensis* MAKINO) ハほんごうさうト共ニ南日本ノ珍稀ナ腐生

植物トシテ 著名デアル。紀州ヨリ四國ヲ經テ 九州南部ニ分布スル。然ル處、近頃意外ノ北方カラコレヲ檢出シ得タ。ソレハ 越後國市振村デアツテ 九里聰雄氏ノ採集品ヲ久内清孝氏ヲ經テ入手、九里氏ハ一昨昭和九年ニコレヲ發見サレタガ 標本良好ナラザル爲、昨十年改メテ多數ノ良好ナ個體ヲ採集 ホルマリン漬ノ標本トシテ送ラレタノデ 充分ニ調ベルコトガ出來、本種ナルヲ確メ得タ。ほんごうさうノ type locality ガ天然紀念物ノ恩惠ニ浴シテ居ル今日、本種ノ上記產地モ北限地トシテ 同様充分ノ保護ヲ望ムモノデアル。猶本種ノ形態等ニツイテハ 右材料ヲ基トシテ記載ト圖トヲ作り、近ク出版ノ運びナル 東亞植物圖說第一卷第二輯(春陽堂發行)ニ載セタ故、同書ニツイテ見ラレタイ。(前川文夫)

○ひなのきんちやくノ學名

同屬ノかきのはぐさトハ又變ツテ可憐ナ小草デアルガ學名ニハ *Polygala triphylla* HAMILTON ex D. DON. *Prodromus. Floræ Nepalensis*: 200 (1825) ガ使ハレテ居ル。シカシソノ原記載ニ依レバ 黃細花ヲ綴リ、葉ニハ 細鋸齒ガアルトイフ。我々ト共ニアルひなのかんざしハ淡紅紫花ヲ開キ、葉ハ全縁デアル點デ異ツテ居ル。一方デハ又 *Polygala triphylla* BURMANN, fil., *Floræ Capensis Prodromus*: 20 (1768) [コノ書ハ有名ナ同氏ノ *Flora Indica* ノ末尾ニ附録トナツテ居ル] ナル先行ノ同一名ガアツテ後出ノ上記 HAMILTON ノ名ハ失效スル。ソコデ北京附近ヲ type locality トスル上ニヨリ圖造伴ツタ *Polygala Tatarinowii* REGEL in Bull. Soc. Nat. Mosc. 34-2: 523, t. 11. f. 10-11 (1861) ガ當然浮ビ上ツテ 使用サレルコトナル。即チ學名ニ關シテハ 帝國大學理科大學植物標品目録: 19 (1886) ヤ矢田部、日本植物編: 198 (1900) ノ昔ニカヘツタ次第デアル。

(前川文夫)

○かはのり臺灣阿里山中ニ産ス

かはのり (*Prasiola japonica* YATABE) ハ日本特産ノ種類デアリ、殊ニ故矢部吉禎博士ニヨツテ有性生殖ノ機構ガ發見サレタカラハ一層注目ノ的トナツタ淡水産綠藻類デアルガ、ソノ產地トシテハ 日光附近ヤ東京府ノ奥多摩・相模川ノ沿岸等ガ知ラレテキルダケデアツタ。筆者ハ先頃臺灣ニ採集ニ行ツタ 折ニ阿里山デ營林所關係ノ人々ガ 同地ノ溪流ニ自生スル藻類ヲ食用ニ供スルコトヲ聞キ、或ハかはのりカト思ヒ早速ソノ正體ヲ見タクナツタガ、幸ヒニモ 同地ノ營林所ニ勤務セラレル武末直之氏ヨリ立派ナ腊葉ヲ割愛サレ、更ニソノ翌1月26日山下伊三郎氏ハ數里ノ道ヲ遠シトセズニ生品ヲ採集シテ著者ニ惠送サレタ。檢鏡調査ノ結果 *Prasiola* 屬ナルコトハ疑フ餘地ガナイガ、果シテ *P. japonica* カドウカ、產地ガアマリニモ南ニ位スルモノデ或ハ外國産ノモノト共通カモ知レヌシ新種トナルカモ知レナイノデ、素人ノ筆者ハ最後ノ斷定ヲ専門家ニ譲リ、タマかはのり屬ノ一種ガ阿里山附近ノ溪流ニ相當廣ク分布シテキルコトヲ報告スルニ止メル。終リニ標本ヲ惠與サレタ兩氏ニ厚ク感謝ノ意ヲ表スル。

(佐藤正己)